

Regelmäßig anzutreffende Tagfalterarten in Berlin/Gatow und Umgebung Tagfalter/Teil 3

FOTO: JAN HERRMANN



(Familie Augenfalter)

Vorkommen:
Offenlandbiotope,
Saumgesellschaften,
Waldlichtungen,
Raupennahrung:
Verschiedene
Süßgräserarten
Sonstiges:
Mittelgroßer
Augenfalter;
meidet mehrfach im
Jahr gemähte Flächen.



Schornsteinfeger
Aphantopus hyperantus

FOTO: JAN HERRMANN



(Familie Augenfalter)

Vorkommen:
Offenlandbiotope
Raupennahrung:
Verschiedene
Süßgräserarten
Sonstiges:
Kleiner Augenfalter;
in allen
Graslandschaften
ziemlich häufig;
starke Behaarung an
Körper und
Unterflügeln.

Kleines Wiesenvögelein
Coenonympha pamphilus

FOTO: JAN HERRMANN



(Familie Augenfalter)

Vorkommen:
Offenlandbiotope
Raupennahrung:
Verschiedene
Süßgräserarten
Sonstiges:
Großer Augenfalter;
♂ auf Oberseite
beinahe einheitlich
dunkel mit Augenfleck,
♀ auf Oberseite des
Oberflügels mit
Orangeanteil (kl. Foto).



Großes Ochsenauge
Maniola jurtina

FOTO: JAN HERRMANN



(Familie Augenfalter)

Vorkommen:
Offenlandbiotope mit
Altgrasbeständen
Raupennahrung:
Verschiedene
Grasarten
Sonstiges:
Mittelgroßer
Augenfalter.

Schachbrettfalter
Melanargia galatea



(Familie Augenfalter)

Vorkommen:
(Laub- und Misch-)
Wälder, Gebüsche,
Parks
Raupennahrung:
Verschiedene
Grasarten
Sonstiges:
Am Boden
ausgezeichnet getarnt.



Waldbrettspiel
Pararge aegeria

FOTO: JAN HERRMANN



(Familie
Dickkopffalter)

Vorkommen:
Offenlandbiotope,
Brachen, Waldränder
Raupennahrung:
Verschiedene
Süßgräser
Sonstiges:
Kleine Tagfalter, die
vom Aussehen her
Nachtfaltern ähneln;
verschiedene, sehr
ähnliche
Dickkopffalterarten im
Gebiet, die vom Laien
kaum zu unterscheiden
sind.

Dickkopffalter
Thymelicus spec.

Alle Fotos wurden, soweit nicht anders gekennzeichnet, im Bereich der Plz. 14089 (zuzüglich Scharfe Lanke, Groß Glienicke, Sakrow) aufgenommen.

♂ = Männchen, ♀ = Weibchen

Weitere Infos und Bestimmungskarten zum Gratis-Download auf www.wak-gatow.de